

用法DB

大分類

医療機関システム

調剤薬局システム

ヘルスケア・解析

中分類

処方監査・
処方確認支援

医療用医薬品情報

概要

医療用医薬品(内・外用薬)の添付文書に記載された用法を登録したデータベース

特徴

適応症、投与経路、年齢等に応じて
1日当たりの投与回数を保持

標準用法用語集*の整理番号、
レセ電算用用法コードも搭載

* 標準用法用語集：処方箋記載方法の標準化のため日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会が作成。

用法DB

ご利用場面

電子カルテで

- 処方時の参照用などとして

調剤支援

- 適切な用法指示か否かのチェック

用法DB

用法データの例

医薬品名: ザイザル錠 5mg

参考) 添付文書の記載の抜粋

〔成人〕 通常、**成人**にはレボセチリジン塩酸塩1回5mgを**1日1回、就寝前**に経口投与する。

〔小児〕 通常、**7歳以上15歳未満**の小児にはレボセチリジン塩酸塩として1回2.5mgを**1日2回、朝食後及び就寝前**に経口投与する。

年齢条件	15 - 999 歳	7 - 15 歳
朝		1
昼		
夕		
就寝前	1	1
食後		1
用法用量	1日1回 就寝前	1日2回 朝食後と就寝前

- 年齢に応じた用法の表示・出力が可能

用法DB

処方監査システム上でのチェック例

5歳 気管支喘息患者さんの処方

薬品名

メプチン顆粒0.01% 1日2回 朝夕食後

メプチン顆粒0.01%の登録データ例

標準病名	気管支喘息
年齢条件	0 - 999 歳
投与要件	1日2回投与の場合
朝	1
昼	
夕	
就寝前	1

チェック結果の表示例



処方内容の用法を確認してください

- 年齢、標準病名等から用法をチェック
- 服用回数や服用方法をチェック