

OTC_薬の説明DB

大分類

調剤薬局システム

ヘルスケア・解析

中分類

一般用医薬品
(OTC)情報

セルフメディケーション
支援

概要

OTC医薬品の各種情報*を一つのファイルにまとめ、システムやアプリに搭載しやすくしたデータ

特徴

医薬品を特定するだけで、
該当医薬品の全情報が確認可能

タグ情報を用い、注目する情報を
効率良く抽出可能

* 製品名、成分・分量、用法・用量、効能・効果、してはいけないこと、飲み合わせ、使用前に相談すること、副作用など

OTC_薬の説明DB

ご利用場面

お薬検索アプリなどで

- OTCの検索・情報表示に

調剤薬局・ドラッグストアのシステムにて

- 販売時の服薬指導の補助に
- 説明文の印刷用に
- お薬手帳への貼付用に

OTC_薬の説明DB

データ構成

基本情報	ブランドコード* 製品名・会社名 成分・分量 リスク区分・薬効分類** JANコード・包装単位・剤形 効能・効果
服用に関する情報	用法・用量 使用上の注意 副作用情報
生活上の注意	飲食物・嗜好品への注意 車の運転・危険な作業への注意
飲み合わせ	併用できない薬 相談が必要な薬
その他の情報	問い合わせ先 保管及び取扱い上の注意

* 独自に付与したコード

** 独自に作成した分類

OTC_薬の説明DB

システム、Web等での表示例

製品名: ロキソニンS

効能・効果

- 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

{ 年 齢 }	成人(15歳以上)
{ 1 回 量 }	1錠
{ 1日服用回数 }	2回まで。

症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。
ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できません。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。

{ 年 齢 }	15歳未満
{ 1 回 量 }	服用しないで下さい。
{ 1日服用回数 }	服用しないで下さい。

<用法・用量に関連する注意>
…(以下略)

JANと包装単位

4987107610867 : 12錠 : 648円

会社名	第一三共ヘルスケア
医薬品区分	一般用医薬品(第1類)
分類名	解熱鎮痛薬
剤形	内用錠

このくすりが使えない人

かぜ薬や解熱鎮痛薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。

- 15歳未満の小児。
- 胃潰瘍の人。
- 十二指腸潰瘍の人。
- 肝臓病の人。
- 腎臓病の人。
- 心臓病の人。

Note: 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。